
Liste des espèces locales recommandées - Cas d'une pelouse sèche -



Batiment F / 18 allée Gustave Prugnat, Moret-sur-Loing / 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 64 31 11 18 / Fax : 01 64 31 16 46 / contact@seme-id77.fr
seine-et-marne-environnement.fr
SIRET : 383 715 836 00037 / Code NAF : APE 913E/9499Z



Espèces locales recommandées pour une pelouse sèche

| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Type de prairie |
|---|-------------------------|--|
| <i>Arabis hirsuta</i> | Arabette hérissée | Pelouses basophiles médioeuropéennes |
| <i>Carlina vulgaris</i> | Carline commune | |
| <i>Centaurea scabiosa subsp. Scabiosa</i> | Centaurée scabieuse | |
| <i>Cirsium acaule</i> | Cirse acaule | Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques |
| <i>Eryngium campestre</i> | Panicaut champêtre | Pelouses basophiles médioeuropéennes |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbe petit-cyprès | |
| <i>Galium verum subsp. Verum</i> | Gaillet jaune | |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Hippocrépide en ombelle | |
| <i>Lotus corniculatus subsp. corniculatus</i> | Lotier corniculé | Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques |
| <i>Medicago lupulina</i> | Luzerne lupuline | |
| <i>Ononis spinosa</i> | Bugrane rampante | |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Boucage saxifrage | Pelouses basophiles médioeuropéennes |
| <i>Primula veris</i> | Primevère officinale | Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Renoncule bulbeuse | |
| <i>Salvia pratensis</i> | Sauge des prés | Pelouses basophiles médioeuropéennes |
| <i>Sanguisorba minor</i> | Petite pimprenelle | |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Scabieuse colombarie | Pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques |
| <i>Teucrium chamaedryx subsp. germanicum</i> | Germandrée petit-chêne | Pelouses basophiles médioeuropéennes |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Aigremoine eupatoire | Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques |
| <i>Bupleurum falcatum subsp. falcatum</i> | Buplèvre en faux | Ourlets basophiles médioeuropéens, xérophiles, occidentaux |
| <i>Campanula rapunculus</i> | Campanule raiponce | |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Clinopode | Ourlets basophiles médioeuropéens |
| <i>Fragaria vesca</i> | Fraisier des bois | Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques |
| <i>Hypericum hirsutum</i> | Millepertuis velu | Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques |
| <i>Inula conyza</i> | Inule conyze | Ourlets basophiles médioeuropéens xérophiles, occidentaux |

Espèces locales recommandées pour une pelouse sèche

| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Type de prairie |
|---|--------------------------|---|
| <i>Knautia arvensis</i> | Knautie des champs | Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques |
| <i>Lathyrus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> | Gesse des prés | |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> | Gesse tubéreuse | Ourlets basophiles médioeuropéens xérophiles |
| <i>Myosotis arvensis</i> subsp. <i>umbrata</i> | Myosotis des champs | Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques |
| <i>Origanum vulgare</i> | Origan commun | Ourlets basophiles médioeuropéens |
| <i>Potentilla sterilis</i> | Potentille faux-fraisier | Ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques |
| <i>Veronica chamaedrys</i> | Véronique petit-chêne | |
| <i>Vicia cracca</i> subsp. <i>cracca</i> | Vesce à épis | |
| <i>Vicia sepium</i> | Vesce des haies | |
| <i>Viola hirta</i> | Violette hérissée | Ourlets basophiles médioeuropéens |